

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к практическим и лабораторным занятиям
по дисциплине
«Химия»
для обучающихся по специальности

09.02.13 Интеграция решений с применением искусственного интеллекта
38.02.07 Банковское дело, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.17 Технология
индустрии красоты, 42.02.01 Реклама.

Ставрополь, 2024 г.

сведения о сертификате ЭЦ

Владелец: Кандаурова Наталья
Владимировна, директор
Сертификат:
0298d2a100a6b37d85433743564d5a7918
Действителен: с 01.12.2025 12:39:11 по
01.03.2027 12:49:11

Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и рабочей программой дисциплины «Химия». В методических указаниях представлен материал для проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине.

Составитель: Смольникова В.В.

Рассмотрено на заседании кафедры ОДиП, протокол № 3 от 22.01.26 г.

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СМК

Введение

В данных методических указаниях описаны методики выполнения лабораторных и практически работ по общей, неорганической и органической химии, дано краткое теоретическое введение к каждой теме, которое при самостоятельной подготовке поможет студентам выполнить эти работы. В приложении к указаниям приведены справочные таблицы, правила техники безопасности и мероприятия по оказанию первой помощи. Методические указания выполнены в соответствии с рабочей программой, составленной на основе государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по *химии*. В ней предусмотрено для СПО практические и лабораторные занятия.

Пособие поможет студентам совершенствовать практические умения и закрепить теоретические знания по дисциплине «Химия». Методические указания состоят из двух частей: первая посвящена практическим занятиям, а вторая - лабораторным работам по общей, неорганической химии и органической химии.

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Код ОК, ПК, ЛР	Освоенные умения	Усвоенные знания
ОК 01	Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 2	Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне	Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов

	информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	поиска информации
ОК 3	Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования
ОК 4	Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
ОК 5	Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений
ОК 07	Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные действия в чрезвычайных ситуациях

В методических указаниях к выполнению лабораторных работ описаны методики их выполнения, приведены контрольные вопросы, фиксирующие внимание студентов на наиболее важные этапы изучаемого материала. Контрольные вопросы составлены на основе личностно-ориентированного подхода в обучении.

В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны наблюдать за ходом эксперимента, отмечать все его особенности (изменение цвета, тепловые эффекты, выпадение осадка, образование газообразных веществ). Результаты наблюдений записывают в тетради для лабораторных работ, поддерживаясь определенной последовательности:

- дата выполнения, название лабораторной работы;
- цель работы;
- краткие теоретические сведения, касающиеся данной работы;
- зарисовка схемы установки (выполняется карандашом);
- результаты опытов должны быть внесены в таблицу;
- выводы.

**Практические занятия №1 Структура атома. Периодический закон и таблица
Д.И. Менделеева.**

Теоретический материал: Параграфы 1 и 2 учебник Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр 9 № 1, 3, 4

Стр 13 № 1, 2, 3, 5, 6

Практические занятия №2. Дисперсные системы. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. (Профессионально-ориентированное содержание).

Теоретический материал: Параграф 9 учебник Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр 49 № 1, 2, 6

Практические занятия №3. Химические свойства, способы получения и применения металлов и неметаллов. (Профессионально-ориентированное содержание)

Теоретический материал: Параграфы 16 и 17 учебник Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр 93 № 1, 2, 3, 5, 6

Стр. 95 № 1, 2, 4, 5

Практические занятия №4. Химические свойства, способы получения и применения кислот и оснований. (Профессионально-ориентированное содержание).

Теоретический материал: Параграфы 19 и 20 учебник Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Практические занятия № 5 Химические свойства, способы получения и применения солей и оксидов. Генетическая связь между классами химических соединений.

Теоретический материал: Параграфы 21 и 22 учебник Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр. 102 № 1, 2, 3, 4

Стр. 115 № 1, 2, 3, 4

**Практические занятия № 6 Предмет органической химии. органических соединений
А. М. Бутлерова.**

Теоретический материал: Параграфы 1 и 2 учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр. 10 № 1, 2, 3, 4

Стр. 15 № 1, 2, 3, 4

Практические занятия № 7. Химические свойства, способы получения и применения предельных углеводов.

Теоретический материал: Параграф 3 учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр. 15 № 1, 2, 3, 4

Практические занятия № 8. Химические свойства, способы получения и применения непредельных углеводов.

Теоретический материал: Параграф 4, 5, 6 учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр. 30 № 1, 2, 4, 5

Стр. 34 № 1, 2, 3, 4

Стр. 39 № 1, 3, 4, 6

Практические занятия № 9. Химические свойства, способы получения и применения сложных эфиров и жиров.

Теоретический материал: Параграфы 11, 12 учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр. 62 № 1, 2, 3, 6

Стр. 69 № 1, 2, 3, 4

Практические занятия №10. Химические свойства, способы получения и применения сахаров.

Теоретический материал: Параграф 14 и 15 учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр. 62 № 1, 2, 3, 6

Стр. 80 № 1, 2, 4, 7

Практические занятия №11. Белки: классификация, строение, физические и химические свойства белков. Биологические функции белков.

Теоретический материал: Параграф 16, 17 и 18 учебник Габр. иелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7

Вопросы и задания к практическому занятию

Стр 86. № 1, 2, 3, 5

Стр. 93 № 1, 2, 3, 5

Стр. 103 № 1, 2, 3, 4

Лабораторные занятия №1 Свойства неорганических веществ. Разделение смесей и очистка веществ

Тест по техники безопасности.

1. При проведении этой работы вы будете пользоваться электроприборами. Что в первую очередь должен сделать учащийся если обнаружит неисправность электроприбора?

- А) по окончании работы доложить об этом учителю;
- Б) попытаться устранить неисправность самому;
- В) работу прекратить и сообщить учителю;
- Г) работать, не обращая внимания на неполадку;

2. Почему фильтрат в фарфоровой чашке не упаривают досуха?

- А) чашка может разрушиться;
- Б) вещество расплавиться;
- В) фильтрат всегда выпаривается досуха;
- Г) после этого чашка трудно отмывается;

3. Почему возгонку йода нельзя проводить в толстостенном химическом стакане?

- А) толстостенный стакан неустойчив к нагреванию;
- Б) толстое стекло неустойчиво к действию агрессивных сред;
- В) такой стакан неудобен в обращении, он тяжелый;
- Г) такой стакан очень долго нагревается;

4. При выпаривании легко воспламеняющихся жидкостей можно?

- А) нагревать смесь в фарфоровой чашке газовой горелкой;
- Б) нагревать смесь в фарфоровой чашке на водяной бане, находящейся на плитке с открытой спиралью;
- В) нагревать смесь в фарфоровой чашке на спиртовке;
- Г) нагревать смесь в фарфоровой чашке на заранее нагретой водяной бане;

5. При взбалтывании смеси веществ в делительной воронке следует периодически открывать закрывающую её пробку...

- А) для внимательного наблюдения за происходящими в делительной воронке процессами;
- Б) для выравнивания давления в делительной воронке и окружающей среде;
- В) чтобы по запаху определить момент окончания процесса;
- Г) чтобы по окончании процесса было легче открыть делительную воронку;

Общие сведения.

В природе все вещества состоят из смесей. В отличие от чистого вещества, не имеет постоянного состава. Смеси делят на однородные и неоднородные.

Компонентом называется каждое вещество смеси. Примесь - это компонент, масса которого в десятки раз меньше массы других компонентов. Свойство каждого вещества в

смеси сохраняется (при этом свойства атомов элементов, составляющих химические соединения не сохраняются).

Разделение смесей - процесс выделения чистых веществ из смесей. Разделяемые продукты имеют различные химические и физические свойства. Для разделения применяют: осаждение, электролиз, экстракцию, хроматографию, дистилляцию, зонную плавку и другие методы.

Кристалли́зация — процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов. Фазой называется однородная часть термодинамической системы отделившаяся от других частей системы (других фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав, структура и свойства вещества изменяются скачками. **Кристаллизация** — это процесс выделения твёрдой фазы в виде кристаллов из растворов или расплавов, в химической промышленности процесс кристаллизации используется для получения веществ в чистом виде. Кристаллизация начинается при достижении некоторого предельного условия, например, переохлаждения жидкости или пересыщения пара, когда практически мгновенно возникает множество мелких кристалликов — центров кристаллизации. Кристаллики растут, присоединяя атомы или молекулы из жидкости или пара. Рост граней кристалла происходит послойно, края незавершённых атомных слоев (ступени) при росте движутся вдоль грани. Зависимость скорости роста от условий кристаллизации приводит к разнообразию форм роста и структуры кристаллов (многогранные, пластинчатые, игольчатые, скелетные, дендритные и другие формы, карандашные структуры и т. д.).

Простая дистилляция — частичное испарение кипящей жидкой смеси путём непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике. Полученный конденсат называется дистиллятом, а неиспарившаяся жидкость — кубовым остатком.

Испарение — процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное (пар). Процесс испарения является обратным процессу конденсации (переход из парообразного состояния в жидкое. Испарение(парообразование), переход вещества из конденсированной (твёрдой или жидкой) фазы в газообразную (пар); фазовый переход первого рода.

Экстра́кция (от лат. *Extraho* — извлекаю) — метод извлечения вещества из раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя (экстрагента). Для извлечения из раствора применяются растворители, не смешивающиеся с этим раствором, но в которых вещество растворяется лучше, чем в первом растворителе. Экстракция может быть разовой (однократной или многократной) или непрерывной (перколяция). Простейший способ экстракции из раствора — однократная или многократная промывка экстрагентом в делительной воронке. Делительная воронка представляет собой сосуд с пробкой и краном для слива нижнего слоя жидкости. Для непрерывной экстракции используются специальные аппараты — экстракторы, или перколяторы.

Цель: изучить методы разделения смесей, получить практические навыки использования различных методов разделения и очистки смесей веществ.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязнённый раствор медного купороса, загрязнённая вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел Свойства Неорганических веществ 1) Разделение смесей и очистка веществ.

Опыт 1. Разделение смеси растворимых и нерастворимых веществ (перекристаллизация медного купороса).

Используя шпатель, поместите 20 г. загрязнённого медного купороса CuSO_4 в химический стакан. Добавьте дистиллированную воду и включите электронагреватель.



Наблюдайте за происходящими изменениями.

Соберите установку для горячего фильтрования как показано на схеме. Отфильтруйте горячий раствор медного купороса в колбу-приемник.

Взвесьте чашку, запишите массу пустой чашки в таблицу.

Перелейте фильтрат в чашку и упарьте его на песчаной бане до появления кристаллов. Взвесьте очищенный медный купорос. Рассчитайте массовую долю примесей в медном купоросе. Занесите результаты в таблицу.

Масса пустой чашки	Масса очищенного медного купороса	Массовая доля примесей

Опыт 2. Очистка жидкостей от неперегоняющихся примесей (получение дистиллированной воды).

Зарисуйте установку для перегонки. В колбу-испаритель прилейте загрязненную воду и шпателем внесите несколько кусочков фарфора для равномерного кипения смеси.

Соберите установку для перегонки жидкостей. Включите подачу холодной воды в водяной холодильник. Нагрейте воду в колбе-испарителе до кипения и поддерживайте равномерное кипение жидкости. Что вы наблюдаете?

Опыт 3. Разделение смесей экстрагированием, отстаиванием и выпариванием.

Внимание: работу проводить в вытяжном шкафу за защитным стеклом.

В делительную воронку налейте эмульсию масла в воде. К эмульсии прилейте равный объем чистого бензина. Хорошо взболтайте смесь, периодически открывая делительную воронку. Дайте смеси отстояться. Что вы наблюдаете?

Открыв кран, слейте в химический стакан нижний (водный) слой, верхний слой перелейте в фарфоровую чашку так, чтобы в нее не попали капельки воды.

Опустив защитное стекло, поставьте фарфоровую чашку на водяную баню, чтобы ускорить испарение бензина – растворителя.

Вопросы итогового контроля:

1. Дайте определение понятиям: вещество, простое вещество, сложное вещество, смесь, компонент, раствор.
2. Признаки истинного раствора.
3. Классификация растворов. Поясните какой раствор является насыщенным, пересыщенным, ненасыщенным.

- Какие способы выражения концентрации раствора вы знаете? Приведите формулы.
- Что происходит при нагревании и кипении загрязненной воды в колбе испарителе? С какой целью может применяться данный процесс на практике?
- Что происходит при отстаивании эмульсии масла и чистого бензина? С какой целью может применяться данный процесс на практике?
- Распределите перечисленные вещества по группам:

Простые вещества	Сложные вещества	Смеси

Медь, молоко, кислород, железо, минеральная вода, гранит, сахар, поваренная соль, воздух.

- Составьте план разделения смеси, состоящей из поваренной соли и случайно попавших в нее частиц древесного угля.

Выпаривание, прокаливание, фильтрование, перемешивание, растворение в воде, притягивание магнитом, возгонка, экстракция.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия №2 Гидролиз

Общие сведения.

Гидролиз (греч. hydor - вода и lysis - разрушение) - процесс расщепления молекул сложных химических веществ за счет реакции с молекулами воды.

Гидролиз солей может протекать: **обратимо**: только небольшая часть частиц исходного вещества гидролизуются и **необратимо**: практически все частицы исходного вещества гидролизуются.

Для оценки типа гидролиза необходимо рассмотреть соль, как продукт взаимодействия основания и кислоты. Любая соль состоит из остатка основания и кислоты. Например, NaCl - производное основания NaOH и кислоты HCl.

Если в состав соли входит остаток сильного основания и остаток сильной кислоты - гидролиза не происходит. Примеры: NaCl, KBr, CaSO₄. Также гидролиза не происходит, если соль нерастворима (вне зависимости от того, чем она образована): AlPO₄, FeSO₃, CaSO₃.

Если в состав соли входит остаток слабого основания и остаток сильной кислоты, то гидролиз идет по катиону. Помните, что гидролиз разрушает слабое, в данном случае - катион. Примеры: AlCl₃, MgBr₂, Cr₂SO₄, NH₄NO₃.

Катион NH₄⁺ и его основание NH₄OH, несмотря на растворимость, является слабым, поэтому гидролиз будет идти по катиону в соли NH₄Cl. Замечу также, что Ca(OH)₂ считается растворимым основанием, поэтому гидролиза соли CaCl₂ не происходит.

Если в состав соли входит остаток сильного основания и остаток слабой кислоты, то гидролиз идет по аниону. Примеры: K₃PO₄, NaNO₂, Ca(OCl)₂, Ba(CH₃COO)₂, K₂SiO₃.



Если соль образована остатком слабого основания и слабой кислоты, то гидролиз идет и по катиону, и по аниону. Примеры: Mg(NO₂)₂, Al₂S₃, Cr₂(SO₃)₃, CH₃COONH₄.

Среда раствора может быть нейтральной, кислой или щелочной. Определяется типом гидролиза.

	Сильное основание <u>NaOH</u> , KOH, Ca(OH) ₂ , Ba(OH) ₂	Слабое основание NH ₄ OH, Al(OH) ₃ , Fe(OH) ₂ , Fe(OH) ₃
Сильная кислота <u>HCl</u> , H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , <u>HClO₄</u>	Гидролиз не идет pH≈7	Гидролиз по катиону pH<7
Слабая кислота H ₂ CO ₃ , H ₂ S, H ₂ SO ₃ , CH ₃ COOH, HCN, H ₃ PO ₄	Гидролиз по аниону pH>7	Гидролиз и по катиону, и по аниону pH≈7

Необратимый гидролиз происходит, если при гидролизе выделяется газ, осадок или вода, т.е. вещества, которые при данных условиях не могут взаимодействовать между собой. Необратимый гидролиз является химической реакцией, т.к. реагирующие вещества взаимодействуют практически полностью.

Факторы, влияющие на степень гидролиза:

1. Температура. Гидролиз — эндотермическая реакция. Нагревание раствора приводит к интенсификации процесса.

2. Концентрация соли. Чем меньше концентрация соли, тем выше степень ее гидролиза. По этой причине для предотвращения нежелательного гидролиза хранить соли рекомендуется в концентрированном виде.

3. Добавление к реакционной смеси кислоты или щелочи. Изменяя концентрация одного из продуктов, можно смещать равновесие реакции гидролиза.

Цель: изучить теоретические основы гидролиза. Изучить влияние основных факторов на интенсивность и полноту протекания гидролиза.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Гидролиз.

Опыт № 1. Первоначальные представления о гидролизе

В три пробирки прилейте, соответственно, растворы карбоната натрия, сульфата алюминия и хлорида натрия. В каждую пробирку добавьте по 4-5 капель индикатора лакмуса фиолетового. Приведите три примера солей из набора, имеющих, по вашему мнению, щелочную, нейтральную и кислую среду раствора. Проверьте свои

предположения экспериментально. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



Опыт № 2. Влияние температуры на степень гидролиза.

Обратимость гидролиза

Налейте в пробирку раствор ацетата натрия и 2-3 капли фенолфталеина. Нагрейте раствор до кипения. Как изменяется цвет раствора в пробирке? Половину окрашенного раствора перелейте в другую пробирку и оставьте для сравнения. Оставшийся раствор охладите до 10°C. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



Опыт № 3. Влияние разбавления на степень гидролиза”.


Прилейте в химический стакан раствор хлорида сурьмы (III) в воде. Испытайте pH раствора универсальной индикаторной бумагой. Добавляйте при помешивании в раствор по каплям дистиллированную воду. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



лабораторном журнале.

Опыт № 4. Полный гидролиз”.

В пробирку прилейте сульфата алюминия. Добавьте раствор карбоната натрия. Нагрейте пробирку почти до кипения в пламени газовой горелки. Отфильтруйте полученный осадок, промойте его на фильтре горячей водой. Докажите опытным путем, что полученный осадок не является солью угольной кислоты. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Дайте определение понятию гидролиз. Какие типы гидролиза вы знаете?
2. В каких случаях гидролиз протекает необратимо?
3. В каких случаях гидролиз не протекает?
4. Объясните, какие образуются вещества и какая среда при гидролизе по аниону? Приведите примеры.
5. Объясните, какие образуются вещества и какая среда при гидролизе по катиону? Приведите примеры.
6. Объясните, какие образуются вещества и какая среда при гидролизе и по аниону и по катиону? Приведите примеры.
7. В каких случаях наблюдается ступенчатый гидролиз?
8. Какие факторы влияют на глубину протекания гидролиза?

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 3 Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.

Общие сведения.

Щелочные металлы расположены в главной подгруппе первой группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Это литий Li, натрий Na, калий K, цезий Cs, рубидий Rb и франций Fr.



Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня щелочных металлов: ns^1 , на внешнем энергетическом уровне находится 1 s-электрон. Типичная степень окисления щелочных металлов в соединениях +1.

В ряду **Li-Na-K-Rb-Cs-Fr**, в соответствии с Периодическим законом, увеличивается атомный радиус, усиливаются металлические свойства, ослабевают неметаллические свойства, уменьшается электроотрицательность.

Все щелочные металлы — вещества мягкие, серебристого цвета. Свежесрезанная поверхность их обладает характерным блеском, обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Кипят и плавятся при низких температурах, имеют низкую плотность.

Качественная реакция на щелочные металлы — окрашивание пламени солями щелочных металлов. Это сильные восстановители, реагируют со всеми неметаллами:

- с галогенами с образованием галогенидов;
- с серой с образованием сульфидов, с фосфором и водородом — образуются фосфида и гидриды;
- с азотом с образованием нитридов, причем литий реагирует при комнатной температуре с образованием нитрида, а остальные щелочные металлы реагируют с азотом при нагревании;
- с углеродом с образованием карбидов;
- с кислородом каждый щелочной металл проявляет свою индивидуальность: при горении на воздухе литий образует оксид, натрий — преимущественно пероксид, калий и остальные металлы — надпероксид. Цезий самовозгорается на воздухе, поэтому его хранят в запаянных ампулах.



Щелочные металлы активно взаимодействуют с водой и солями, с образованием щелочи и водорода. Щелочные металлы никогда не принимают отрицательных степеней окисления, они одновалентны, проявляют постоянную степень окисления +1 .

Цель: изучить качественные реакции на щелочные металлы; изучить химические свойства щелочных металлов.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.

Опыт №1. Горение щелочных и щелочноземельных металлов на воздухе.

Внимание: работу проводить в вытяжном шкафу за защитным стеклом. Возьмите кусочек металла тигельными щипцами, внесите его в пламя газовой горелки и сильно нагрейте. Наблюдайте воспламенение металла и его горение. Результаты эксперимента оформите в лабораторном журнале. Проведите аналогичные опыты с остальными металлами, отметьте цвет пламени при их сгорании. Примечание. Щелочные металлы хранятся в специальной таре. В данном случае склянки с металлами уже приготовлены для опыта.



Опыт № 2. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.

Внимание: работу проводить в вытяжном шкафу за защитным стеклом. В три фарфоровые чашки прилейте воду. Поместите тигельными щипцами в каждую из них, соответственно, по кусочку лития, натрия и калия. Испытайте фенолфталеином все полученные растворы. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале. Повторите эксперимент с магнием, кальцием и барием.



Опыт № 3. Взаимодействие оксидов щелочных. и щелочноземельных металлов с водой и кислотами.

Внимание: работу проводить в вытяжном шкафу за защитным стеклом. В шесть фарфоровых чашек прилейте воду. Затем добавьте по 1 шпателю соответствующего оксида. Испытайте индикатором (фенолфталеин) полученные растворы. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале. Повторите опыт, заменив воду 0,1М раствором соляной кислоты.



Опыт №4. Взаимодействие гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов с кислотами.

В пробирку прилейте исследуемую щелочь. Добавьте 2-3 капли индикатора фенолфталеина. Прибавляйте по каплям раствор кислоты до исчезновения малиновой окраски. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале. Повторите эксперимент с другими растворами кислот и щелочей.



Вопросы к итоговому контролю

1. Какие металлы относят к щелочным? В какой группе Таблицы Д.И. Менделеева находятся щелочные металлы?
2. Напишите электронные формулы для щелочных металлов.
3. Охарактеризуйте физические свойства щелочных металлов.
4. Какая реакция является качественной на щелочные металлы?
5. Какие вещества образуются при взаимодействии щелочных металлов с кислородом? Напишите уравнения реакций.
6. Какие вещества образуются при взаимодействии щелочных металлов с водой? Напишите уравнения реакций.
7. Какие вещества образуются при взаимодействии щелочных металлов с с водородом и азотом? Напишите уравнения реакций.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 4 Свойства кислорода

Общие сведения.

В периодической таблице элементов Д.И. Менделеева неметаллы сосредоточены в верхней правой части таблицы. Для неметаллов характерны окислительные свойства. Окислительную способность элемента характеризует величина относительной электроотрицательности. Чем больше это значение, тем сильнее проявляются окислительные свойства. Сильнее всего окислительные свойства выражены у фтора, он не проявляет восстановительных свойств. Все остальные неметаллы могут проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства.

Простые вещества – неметаллы могут иметь как молекулярное строение, так и немолекулярное. Типичные неметаллы: галогены, кислород, азот, водород – имеют молекулярное строение. В твёрдом состоянии такие вещества образуют молекулярную кристаллическую решётку. В нормальных условиях – это газообразные вещества, легкокипящие жидкости или твердые вещества с низкой температурой плавления. Неметаллы бор, кремний и углерод имеют немолекулярное строение, образуют атомные кристаллические решётки, что обуславливает высокую твёрдость и тугоплавкость веществ. Углерод, кремний и бор могут образовывать кристаллы, и встречаются в аморфном состоянии. Кристаллические модификации этих неметаллов очень твёрдые, в химические реакции вступают с трудом.




Кислород находится в VIA группе периодической таблицы элементов, на внешнем уровне - 6 электронов. Кислород расположен во втором периоде, его атом имеет всего два электронных слоя, в составе которых нет d-орбиталей. Спаренные электроны, расположенные на 2s и 2p подуровнях, кислород может образовывать только две ковалентные связи. Кислород – второй по силе после фтора окислитель среди неметаллов. Он окисляет практически все металлы, многие неметаллы и даже благородные газы. Восстановителем кислород выступает только в реакциях с фтором. В реакциях с активными металлами и водородом сера является окислителем, а в реакциях с кислородом и галогенами проявляет восстановительные свойства.

Кислород применяют для дыхания в авиации и в подводных лодках, в медицине, используют в конвертерном производстве стали, для кислородного дутья в доменных печах, в производстве ферросплавов, выплавке цветных металлов, для резки и сварки металлов. Жидкий кислород используют как окислитель в ракетных двигателях.

Химические свойства неметаллов

Неметаллы взаимодействуют с: неметаллами, металлами, сложными веществами.

- реагируют с кислотами окислителями (H_2SO_4 (конц.) и HNO_3)




- HNO_3 окисляет неМе до соответствующих кислот. У HNO_3 (конц.) азот восстанавливается до NO_2




- у HNO_3 (разб.) азот восстанавливается до NO

- C Si реагирует только




- для углерода и водорода как восстановителей характерно взаимодействие с оксидами Ме и неМе;




Реакции диспропорционирования:

галогены (кроме фтора) и сера при взаимодействии со щелочами



хлор и бром при взаимодействии с водой



Неметаллы находятся в земной коре (в большинстве своем кислород и кремний — 76 % от массы земной коры а также As, Se, I, Te, но в очень незначительных количествах), в воздухе (азот и кислород), в составе растительной массы (98,5 % — углерод, водород, кислород, сера, фосфор и азот), а также в основе массы человека (97,6 % — углерод, водород, кислород, сера, фосфор и азот). Водород и гелий — входят в состав космических объектов, включая Солнце. Чаще всего в природе неметаллы встречаются в виде соединений.


Цель: изучить химические свойства неметаллов на примере химических свойств кислорода.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Свойства кислорода.

Опыт № 1. Свойства кислорода.



Возьмите большой химический стакан, заполненный кислородом. Положите кусочек угля в ложечку для сжигания веществ и нагрейте его в пламени горелки до начала тления. Внесите тлеющий уголь в стакан с кислородом. По окончании горения угля, в стакан прилейте известковой воды. Составьте уравнения проведенных реакций. Положите кусочек серы в ложечку для сжигания веществ и нагрейте его в пламени горелки до начала горения. Внесите горящую серу в стакан с кислородом. По окончании горения серы, в стакан прилейте воды и несколько капель лакмуса. Составьте уравнения проведенных реакций. Возьмите стальную проволоку и зажгите ее конец с расплавленной серой. Внесите горящую проволоку в стакан с кислородом. Составьте уравнения проведенных реакций. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 3. Получение озона и исследование его свойств



Подайте кислород в озонатор. Включите озонатор. Пропустим выделяющийся озон в стакан с разбавленным голубым раствором индиго. Затемните помещение. Включите освещение. В пустом стакане смешайте растворы нитрата свинца и сульфида натрия. Пропустите выделяющийся озонированный кислород через стакан с черной взвесью. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 4. Получение сероводорода и его свойства

Внимание: работу проводить в вытяжном шкафу за защитным стеклом. Соберите прибор, изображенный на рисунке. В колбу поместите кусочки сульфида железа, в



капельную воронку - раствор серной кислоты, в химический стакан - дистиллированную воду. Прилейте в колбу раствор серной кислоты и наблюдайте пробулькивание газа через воду в стакане. В пробирку прилейте полученную сероводородную воду, добавьте несколько капель раствора соли из присутствующего набора. К полученным осадкам сульфида цинка и сульфида меди (II) добавьте разбавленную соляную кислоту. В пробирку налейте раствор перманганата калия, подкислите его разбавленной серной кислотой и прилейте сероводородную воду. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 5. Получение оксида серы (IV) и его свойства

Внимание: работу проводить в вытяжном шкафу за защитным стеклом. Соберите прибор, изображенный на рисунке. В колбу поместите кристаллический сульфит натрия, в капельную воронку - концентрированную серную кислоту, в химические стаканы - дистиллированную воду и раствор фуксина. Прилейте часть кислоты в колбу и наблюдайте пробуждение газа через воду в стакане. Добавьте в стакан 3-4 капли лакмуса. Пропустите выделяющийся сернистый газ в стакан с концентрированным раствором фуксина, а затем стакан нагрейте до кипения. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



Вопросы к итоговому контролю

1. Каковы особенности строения атомов неметаллов? Охарактеризуйте строение атомов кислорода.
2. Назовите шесть неметаллов являющихся биогенными элементами, образующие важнейшие органические вещества живой клетки.
3. Как изменяются окислительные свойства неметаллов по ПСХЭ? Что понимают под электроотрицательностью?
4. Охарактеризуйте физические свойства неметаллов. Для каких веществ характерна аллотропия. Приведите примеры.
5. Охарактеризуйте химические свойства неметаллов. Приведите примеры.
6. Как неметаллы взаимодействуют с металлами? Приведите примеры.
7. Как неметаллы взаимодействуют со сложными веществами? Приведите примеры.
8. Приведите несколько примеров применения неметаллов.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 5 Свойства кислот и оснований

Общие сведения.

Кислоты – сложные вещества, которые при взаимодействии с водой образуют в качестве катионов только ионы H^+ (или H_3O^+).

В водных растворах кислоты диссоциируют на катионы водорода H^+ и анионы кислотных остатков. При этом сильные кислоты диссоциируют почти полностью, а слабые кислоты диссоциируют частично. Например, соляная кислота диссоциирует почти полностью: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато. Например, сернистая кислота диссоциирует в две ступени: $H_2SO_3 \leftrightarrow H^+ + HSO_3^-$ и далее $HSO_3^- \leftrightarrow H^+ + SO_3^{2-}$

Кислоты изменяют окраску индикатора. Водный раствор кислот окрашивает лакмус в красный цвет, метилоранж в красный цвет. Фенолфталеин не изменяет окраску в присутствии кислот.

Кислоты реагируют с основаниями и основными оксидами. С нерастворимыми основаниями и соответствующими им оксидами взаимодействуют только растворимые кислоты.

нерастворимое основание + растворимая кислота = соль + вода

основный оксид + растворимая кислота = соль + вода

Например, гидроксид меди (II) взаимодействует с растворимой бромоводородной кислотой: $\text{Cu(OH)}_2 + 2\text{HBr} \rightarrow \text{CuBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

С сильными основаниями (щелочами) и соответствующими им оксидами реагируют любые кислоты.

Щёлочи взаимодействуют с любыми кислотами — и сильными, и слабыми. При этом образуются средняя соль и вода. Эти реакции называются реакциями **нейтрализации**.

щёлочь(избыток)+ кислота = средняя соль + вода

Кислоты реагируют и с нерастворимыми солями. При этом более сильные кислоты вытесняют менее сильные кислоты из солей. Например, карбонат кальция (соль угольной кислоты), реагирует с соляной кислотой: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

Кислоты взаимодействуют с металлами. При этом протекает окислительно-восстановительная реакция. Однако минеральные кислоты и кислоты-окислители взаимодействуют по-разному.

К минеральным кислотам относятся соляная кислота HCl, разбавленная серная кислота H₂SO₄, фосфорная кислота H₃PO₄, плавиковая кислота HF, бромоводородная HBr и йодоводородная кислоты HI и др. Такие кислоты взаимодействуют только с металлами, расположенными в ряду активности до водорода. При взаимодействии минеральных кислот с металлами образуются соль и водород:

минеральная кислота + металл = соль + H₂ ↑

Например, железо взаимодействует с соляной кислотой с образованием хлорида железа (II): $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$

Основания (гидроксиды) — это сложные вещества, которые состоят из катиона металла и гидроксильной группы (OH). Общая формула оснований: Me(OH)_n, где Me — химический символ металла, n — индекс, который зависит от степени окисления металла.

Основания при обычных условиях — это твердые кристаллические вещества без запаха, нелетучие, чаще всего белого цвета. Растворы щелочей изменяют окраску индикатора.

Щелочи вступают в реакцию с любыми кислотными оксидами. Нерастворимые основания взаимодействуют только с кислотными оксидами, которые соответствуют сильным кислотам.

Кислотный оксид + основание = соль + вода

Например: $\text{N}_2\text{O}_5 + 2\text{NaOH} = 2\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Щелочи вступают в реакцию со всеми кислотами. Нерастворимые основания могут взаимодействовать только с сильными кислотами.

Основание + кислота = соль + вода

Например: $\text{Ba(OH)}_2 + 2\text{HNO}_3 = \text{Ba(NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Взаимодействие основания с кислотой называют реакцией нейтрализации — это частный случай реакции обмена.

Основания взаимодействуют с растворимыми солями по обменному механизму. В результате такой реакции должен выделиться осадок или газ (CO₂, SO₂, NH₃).

Основание + соль = другое основание + другая соль

Например: $\text{KOH} + \text{MgSO}_4 = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{K}_2\text{SO}_4$

При нагревании нерастворимые основания разлагаются на соответствующий оксид (степень окисления металла остается неизменной) и воду.

Цель: изучить основные химические свойства кислот и оснований.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Свойства кислот и оснований.

Опыт №1. Взаимодействие кислот и растворимых в воде оснований с индикаторами



Налейте в пробирку раствор кислоты или щелочи. К раствору добавьте 2-3 капли индикатора. Наблюдайте характерное окрашивание индикатора. Повторите опыт с другими индикаторами и другими кислотами и щелочами. Составьте уравнения реакций в ионном виде. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 2 Взаимодействие растворов кислот (HCl , H_2SO_4 , H_3PO_4) и щелочей с металлами”.

В две пробирки поместите по грануле металла (например, цинка). Учтите, что металлы, расположенные в ряду напряжений от Li до Ca, очень активно (со взрывом) взаимодействуют с кислотами. По этой причине такие реакции не проводят. В одну пробирку прилейте раствор кислоты, а в другую – раствор щелочи. Наблюдайте за протеканием реакций. Если реакция не идет, слегка подогрейте пробирку в пламени газовой горелки. Сравните положение металла в ряду напряжений металлов и их взаимодействие с кислотой или основанием. Повторите аналогичные опыты с другими металлами, кислотами и растворимыми в воде основаниями (щелочами). Напишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте краткие ионные уравнения. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



Опыт № 3. Взаимодействие азотной кислоты с металлами



В пробирку положите гранулу магния. Прилейте 3% раствор азотной кислоты. Повторите опыт с 10%, 20%, 30% и 60% растворами азотной кислоты. Напишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте краткие ионные уравнения. Сделайте вывод. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 4. Взаимодействие кислот и щелочей с оксидами металлов



В три химических стакана поместите соответственно: основной, амфотерный и кислотный оксиды. Прилейте в каждый стакан концентрированной хлороводородной кислоты или концентрированного раствора щелочи и перемешайте смесь. Если реакция не идет или идет медленно, смесь следует подогреть. Оформите результаты эксперимента в лабораторном журнале.

Опыт № 5. Взаимодействие кислот с основаниями (реакция нейтрализации)



Поместите в пробирку один шпатель нерастворимого в воде основания (например, гидроксид меди) или щелочь. (Щелочь надо окрасить 2-3 каплями фенолфталеина).

Приливайте раствор кислоты, перемешивая смесь встряхиванием, до растворения осадка или обесцвечивания малиновой окраски фенолфталеина. Напишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте краткие ионные уравнения. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 6. Взаимодействие кислот и щелочей с солями



Прилейте в пробирку раствор исследуемой кислоты или щелочи. Добавьте раствор соли и перемешайте встряхиванием содержимое пробирки. Сверьте свои наблюдения с таблицей растворимости солей. Напишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте краткие ионные уравнения. Повторите опыт с другими реактивами. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

журнале.

Опыт № 7. Свойства амфотерных гидроксидов



В пробирку прилейте растворимую соль алюминия. Осторожно по каплям, при перемешивании, добавьте разбавленный раствор гидроксида натрия до появления белого осадка. Образовавшийся осадок разделите на две пробирки. В первую прилейте раствор соляной кислоты, во вторую – концентрированный раствор щелочи. Перемешайте растворы.

Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Дайте определение понятиям: кислота, основание. Приведите по 2 примера этих веществ.
2. Приведите классификацию кислот.
3. Приведите классификацию оснований.

4. Охарактеризуйте химические свойства разбавленных кислот.
5. Охарактеризуйте химические свойства оснований.
6. Какие виды оснований существуют? Чем они отличаются? К какому виду оснований относится $Zn(OH)_2$?
7. Взаимодействуют ли основания с основными оксидами? Приведите примеры веществ, с которыми основания вступают в реакцию.
8. Можно ли получить гидроксид алюминия с помощью взаимодействия алюминия с водой?

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 5 Свойства солей.


Общие сведения.

Солями называются сложные вещества формула молекулы которых, состоит из атомов металлов и кислотных остатков (иногда могут содержать водород). Например, $NaCl$ – хлорид натрия, $CaSO_4$ – сульфат кальция и т. д. Практически все соли являются ионными соединениями, поэтому в солях между собой связаны ионы кислотных остатков и ионы металла. Химические свойства солей определяются свойствами катионов и анионов, которые входят в их состав:


1. Некоторые соли разлагаются при прокаливании:




2. Взаимодействуют с кислотами с образованием новой соли и новой кислоты. Для осуществление этой реакции необходимо, чтобы кислота была более сильная чем соль, на которую воздействует кислота:




3. Взаимодействуют с основаниями, образуя новую соль и новое основание:



4. Взаимодействуют друг с другом с образованием новых солей:




5. Взаимодействуют с металлами, которые стоят в ряду активности до металла, который входит в состав соли:




Получение солей. Основные способы получения солей:

1. Взаимодействие кислот с основаниями (реакция нейтрализации).



2. Взаимодействие кислот с металлами, основными оксидами и солями.



3. Взаимодействие оснований с кислотными оксидами и солями.
4. Взаимодействие основных оксидов с кислотными оксидами.
5. Взаимодействие двух солей между собой.

Цель: изучить химические свойства солей.


Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная

воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Свойства солей.

Опыт №1. Разложение солей при нагревании



Соберите прибор, изображенный на рисунке. Поместите в стеклянную трубку исследуемую соль. Подсоедините трубку, подводящую азот, к прибору и сильно нагрейте исследуемую соль в пламени газовой горелки, одновременно продувая через нее слабый ток азота. Наблюдайте за изменениями, происходящими с исследуемой солью и с веществами в поглотительных приборах. По результатам наблюдений запишите уравнения реакций в молекулярном виде. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале. Повторите опыт с другими солями.

Опыт №2. Взаимодействие растворов солей с металлами



Поместите в три пробирки соответственно гранулы алюминия, цинка и меди. Прилейте в каждую пробирку раствор сульфата никеля (II). Через 1-2 минуты рассмотрите содержимое пробирок. Сопоставьте свои наблюдения с положением металлов в электрохимическом ряду напряжений металлов. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт №3. “Взаимодействие растворов солей с кислотами и щелочами



Прилейте в пробирку раствор исследуемой кислоты или щелочи. Добавьте раствор соли и перемешайте встряхиванием содержимое пробирки. Сверьте свои наблюдения с таблицей растворимости солей. Напишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте краткие ионные уравнения. Повторите опыт с другими реактивами. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.


Опыт №4. Взаимодействие растворов солей с солями



В пробирке смешайте 2 раствора разных солей. Сверьте свои наблюдения с таблицей растворимости солей. Повторите опыт с другими растворами солей. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Дайте определение понятиям: соль, кислая соль, основная соль.
2. Охарактеризуйте химические свойства солей
3. Сформулируйте условия, при которых соли могут взаимодействовать с металлами. Приведите три примера?
4. Каковы условия взаимодействия солей с кислотами? Приведите три примера.
5. В каком случае соли могут реагировать между собой? Что при этом получается? Приведите уравнения трех реакций.
6. Какие способы получения солей Вам известны? Приведите примеры.
7. Как называются следующие соли: Na_2SO_4 , KHSO_4 , FeOHCl_2 , ZnCl_2 , $(\text{CuOH})_2\text{SO}_2$, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$? К какому типу солей они относятся? Напишите уравнения реакций их получения нейтрализацией соответствующей кислоты основанием.
8. Осуществите цепочку превращений:



По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 6 Предельные углеводороды.

Общие сведения.

Предельными (насыщенными) углеводородами называют углеводороды, в молекулах которых атомы углерода связаны между собой простой (одинарной) связью, а все остальные валентности насыщены атомами водорода.


Наиболее типичный представитель предельных углеводородов - метан CH_4 широко распространен в природе, образуется при разложении растительных веществ без доступа воздуха. Он встречается в свободном состоянии в качестве природного газа или в растворенном состоянии в нефти в виде попутных нефтяных газов. Метан — газ без цвета и запаха, легче воздуха, плохо растворим в воде, горит слабосветящимся пламенем. С воздухом образует взрывчатую смесь, ядовит.

Химические свойства.




Метан, как и все представители этого ряда, обладает низкой реакционной способностью. На метан не действуют ни кислоты, ни щелочи. Он не способен к реакциям присоединения.

Метан проявляет следующие химические свойства:

1) метан легко реагирует с галогенами




может и дальше идти замещение атомов водорода атомами галогена




2) под действием водяного пара метан подвергается конверсии



3) в избытке кислорода сгорает до CO_2 и H_2O



4) в результате пиролиза (нагревания при высокой температуре без доступа воздуха) метана в промышленности получают сажу:



5) при пропускании через метан электрического разряда образуется ацетилен:



Получение. Метан можно получить:

1) непосредственно из углерода и водорода на никелевом катализаторе при температуре $500\text{ }^\circ\text{C}$:



2) гидролизом карбида алюминия



3) сплавлением ацетата натрия с щелочам



Цель: изучить химические свойства предельных углеводородов на примере метана.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел Свойства органических веществ лабораторную работу Предельные углеводороды.

Опыт № 1. Получение метана и его свойства



В фарфоровой чашке смешайте безводный ацетат натрия и прокаленный едкий натр. Поместите смесь в пробирку. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой и закрепите в лабораторном штативе с небольшим наклоном в сторону пробки. Сильно нагрейте смесь. Проверив выделяющийся метан на чистоту, подожгите его у конца газоотводной трубки. Пропустите выделяющийся метан через бромную воду и раствор перманганата калия. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт №2. Отношение алканов к H_2SO_4 (конец)



В пробирку прилейте насыщенный углеводород и концентрированную серную кислоту. Содержимое пробирки взбалтывайте в течении 2-3 минут. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 2. Бромирование алканов



В пробирку прилейте насыщенный углеводород и добавьте несколько капель раствора брома в четыреххлористом углероде. Охладите пробирку, опустив ее в холодную воду, и перемешайте смесь встряхиванием. Затем пробирку опустите в горячую воду. Поднесите к отверстию пробирки влажную синюю лакмусовую бумажку. Что подтверждают ваши наблюдения? Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале

Вопросы к итоговому контролю

1. Какие углеводороды называют предельными?
2. Гомологический ряд алканов. Назовите первые 10 представителей гомологического ряда алканов.
3. Что такое радикал? Перечислите названия первых четырех радикалов.
4. Назовите правила Международного союза теоретической и прикладной химии, в соответствии с которыми необходимо называть углеводороды.
5. Что такое изомер? Напишите все возможные изомеры гексана. Назовите их по международной номенклатуре.
6. Охарактеризуйте химические свойства предельных углеводородов.
7. Напишите уравнения реакций последовательного окисления метана бромом и назовите все бромпроизводные.
8. Напишите уравнения реакций изомеризации. Назовите все вещества.
9. Напишите уравнения термического разложения углеводородов. Назовите все вещества.
10. Охарактеризуйте способы получения предельных углеводородов.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 7. Непредельные углеводороды

Общие сведения.


Непредельными называют углеводороды, в молекулах которых имеются атомы углерода, связанные двойной (этиленовые, алкены), тройной (ацетиленовые, алкины) или двумя двойными (диеновые, алкадиены) связями.

Алкены – углеводороды, в молекулах которых присутствует одна двойная связь, отвечают общей формуле C_nH_{2n} , **алкины** (имеют в молекуле одну тройную связь) и **алкадиены** (содержат две двойные связи) — C_nH_{2n-2}

Наиболее типичным представителем алкенов является этилен. Этилен - бесцветный газ со слабым запахом, плохо растворяется в воде, но хорошо - в спирте. Горит светящимся пламенем. С воздухом этилен образует взрывчатую смесь.


Химические свойства. Непредельные углеводороды значительно более реакционноспособны по сравнению с предельными углеводородами.

1. При обычных условиях этилен легко присоединяет хлор и бром:



Обесцвечивание бромной воды является характерной реакцией для непредельных углеводородов.


2. Другой реакцией для распознавания непредельных углеводородов служит реакция обесцвечивания перманганата калия в водной среде:



3. В присутствии катализатора (платины, палладия или никеля) этилен способен присоединять водород — реакция гидрирования.




4. Гидратация этилена может происходить в присутствии серной кислоты или фосфатных катализаторов:



5. Этилен поглощается концентрированной серной кислотой с образованием этилсерной кислоты:



При гидролизе этилсерной кислоты образуется серная кислота и этиловый спирт:



6. В присутствии катализатора (платины, палладия или никеля) этилен способен присоединять водород — реакция гидрирования.



Присоединение галогеноводородов, воды, серной кислоты происходит **по правилу В. В. Марковникова**. атом водорода присоединяется к наиболее гидрогенизированному (связанному с большим числом атомов водорода) атому углерода молекулы олефина, а оставшийся фрагмент молекулы — к наименее гидрогенизированному.

7. При нагревании под большим давлением или в присутствии катализатора этилен способен полимеризоваться, т. е. образовывать длинные цепи между собой за счет разрыва двойной связи:




Относительная молекулярная масса полиэтилена изменяется от 20 000 до 1 000 000.


Реакции, в результате которых образуются соединения, имеющие тот же состав, но более высокую относительную молекулярную массу, называют реакциями полимеризации. Высокомолекулярные продукты полимеризации называют полимерами.

Получение.

1. Основой для получения этилена в промышленности являются крекинг-газы и попутные нефтяные газы, содержащие углеводороды C1 - C4; в частности, этилен можно получить дегидрированием этана:



2. Отщепление воды от этилового спирта в присутствии Al₂O₃ при высокой температуре или действии концентрированной серной кислотой при температуре 170 °С (при 140 °С и другом соотношении компонентов получается диэтиловый эфир) приводит к получению этилена:




Применение. Этилен — важнейший продукт органического синтеза. Он служит сырьем для производства этилового спирта, полиэтилена, окиси этилена, уксусной и пропионовой кислот, этилбензола, которые в свою очередь являются исходным сырьем для производства ряда других веществ.

Простейшим представителем ряда **алкинов** является ацетилен C₂H₂. Из ацетилена путем замещения в его молекуле атомов водорода можно получить другие члены гомологического ряда углеводородов с одной тройной связью. Ацетилен — бесцветный газ, в чистом виде без запаха, плохо растворяется в воде и в большинстве органических растворителей, хорошо растворяется в ацетоне. На воздухе горит белым сильно коптящим пламенем; в смеси с кислородом горит ярким пламенем без копоти, температура кислородно-ацетиленового пламени при этом достигает более 3 000 °С.

Химические свойства.

1. Атом водорода, находящийся у тройной связи, обладает кислотными свойствами и способен замещаться на металлы с образованием ацетиленидов:



2. При пропускании ацетилена через аммиачный раствор нитрата серебра образуется белый осадок ацетиленида серебра



Эта реакция применяется для обнаружения группы =СН, так как образование подобных производных невозможно для алканов и алкенов.

3. Реакции присоединения с ацетиленовыми углеводородами происходят значительно легче по сравнению с этиленовыми. Присоединение водорода и галогенов к ацетиленовым углеводородам происходит в две стадии:

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Непредельные углеводороды.

Опыт № 1. Получение этилена и его свойств

В химическом стакане приготовьте смесь для получения этилена, смешав этиловый спирт и концентрированную серную кислоту. В колбу поместите несколько кипятыльников (кусочков битого фарфора) для равномерного кипения смеси. В колбу прилейте реакционную смесь. Колбу со смесью осторожно нагрейте, следя за тем, чтобы вспенивающаяся жидкость не перебросилась в склянку для осушения газов. Пропустите выделяющийся этилен в стакан с бромной водой.



Пропустите выделяющийся этилен в стакан с раствором перманганата калия. Достаньте газоотводную трубку из раствора и подожгите выделяющийся этилен. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

3.2.2. Лабораторный опыт “Получение ацетилена и его свойства”.

Соберите прибор, изображенный на рисунке. В колбу поместите несколько кусочков карбида кальция, а капельную воронку для более спокойного протекания реакции прилейте раствор хлорида натрия. Прилейте хлорид натрия и сразу же закройте колбу пробкой.



Пропустите выделяющийся ацетилен в стакан с бромной водой. Пропустите выделяющийся ацетилен в стакан с раствором перманганата калия. Смочите полоску фильтровальной бумаги аммиачным раствором хлорида меди (I) и поднесите ее к отверстию газоотводной трубки, из которой выделяется ацетилен. Достав газоотводную трубку из раствора, подожгите выделяющийся ацетилен.

Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Какие углеводороды называют предельными? Напишите общую формулу для алканов и алкинов.
2. Строение, номенклатура и изомерия алкенов.
3. Приведите краткую характеристику физических свойств этилена.
4. Кратко охарактеризуйте химические свойства алкенов.
5. Приведите примеры применения алкенов.
6. Приведите краткую характеристику физических свойств ацетилена.
7. Строение, номенклатура и изомерия алкинов.
8. Кратко охарактеризуйте химические свойства алкинов.
9. Приведите примеры применения алкинов.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 8. Ароматические углеводороды

Общие сведения.


Аренами называют циклические углеводороды состава C_nH_{2n-6} , имеющие в составе замкнутую плоскую сопряженную систему связей содержащую $(4n+2)$ p-электронов, где $n = 0, 1, 2, \dots$ (Правило Хюккеля). Простейшим представителем ароматических углеводородов или аренов является **бензол** C_6H_6 .

Бензол — бесцветная жидкость с характерным запахом; плохо растворяется в воде, спирте, эфире, ацетоне, легко воспламеняется и горит ярким коптящим пламенем.

Химические свойства. Исходя из строения бензола, равноценности всех связей между атомами углерода можно сказать, что бензол является углеводородом с большой склонностью к реакциям замещения.


Однако в особых условиях реакции присоединения все же возможны.

1. Замещение атомов водорода галогенами приводит к получению галогенопроизводных бензола:



При повышении температуры и в присутствии катализаторов ($AlBr_3$, $FeBr_3$) галогенами могут быть замещены два, три и все атомы водорода.


2. При действии концентрированной азотной кислоты в смеси с серной кислотой атом водорода в молекуле бензола заменяется нитрогруппой NO_2 . Эта реакция называется реакцией нитрования, а образующееся соединение — нитробензолом.



3. При действии концентрированной серной кислоты атом водорода замещается на сульфогруппу $-SO_3H$ и образуется бензолсульфокислота (реакция сульфирования).




4. При действии на бензол галогенопроизводных предельных углеводородов в присутствии катализаторов ($AlCl_3$, H_2SO_4 , BF_3) атом водорода в бензольном ядре замещается на радикал:




5. При высокой температуре под давлением в присутствии никелевого или платинового катализатора бензол присоединяет 3 моля водорода и превращается в циклогексан:

углеродных атомов числом не менее шести замыкается в циклогексановое кольцо, образовавшийся циклопарафин дегидрируют до соответствующего ароматического углеводорода:



или в общем виде:



Эта реакция каталитической ароматизации (или каталитического риформинга) была открыта Н.Д. Зелинским. В настоящее время почти все установки каталитического риформинга работают на платиновом катализаторе, нанесенном на оксид алюминия, при температуре 500 °С под давлением водорода 2 — 4 МПа, а сам процесс получил название платформинга, или риформинга на алюмоплатиновом катализаторе.

В лаборатории бензол можно получить полимеризацией ацетилена.

Применение бензола: для получения пластмасс, резины, лекарственных средств, красителей.

Цель: изучить свойства ароматических углеводородов на примере бензола.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Ароматические углеводороды.

Опыт №1. Бромирование бензола

Внимание! Работу проводить в вытяжном шкафу! В круглодонную колбу поместите железные опилки и прилейте бензол. В химический стакан прилейте воду и добавьте несколько капель лакмуса. Установите капельную воронку.



В капельную воронку прилейте бром. Соберите прибор, изображенный на рисунке. В круглодонную колбу добавляйте по каплям бром. После добавления всего брома реакционную смесь нагревайте в течении 30 минут на водяной бане. Повысить температуру водяной бани до 60-70°С. Прекратите нагревание. Из остывшего прибора перелейте жидкость в стакан с дистиллированной водой. Результаты эксперимента оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 2. Получение нитробензола

Внимание! Работу проводить в вытяжном шкафу! В круглодонную колбу прилейте концентрированную серную кислоту. Поместите колбу в кристаллизатор со снегом.



Постепенно при перемешивании добавьте концентрированную азотную кислоту. Соберите прибор, изображенный на картинке. Прилейте в капельную воронку бензол. После охлаждения нитрующей смеси порциями из капельной воронки добавьте бензол. Энергично перемешивая смесь, следите, чтобы ее температура не поднималась выше 60°C. После прибавления всего бензола для завершения реакции колбу при энергичном перемешивании нагревайте в течение 30 минут на водяной бане. По окончании реакции смесь охладите до 20°C. Перелейте смесь в стакан с большим количеством воды. Напишите уравнение реакции нитрования бензола. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Какие соединения называют ароматическими? Приведите общую формулу.
2. Объясните строение бензола.
3. Номенклатура и изомерия ароматических соединений.
4. Физические свойства бензола.
5. Химические свойства ароматических соединений.
6. Важнейшие гомологи бензола. Как метильный радикал влияет на химические свойства гомологов бензола?
7. Получение ароматических углеводородов
8. Напишите структурные формулы: а) бензола; б) этилбензола; в) толуола; г) орто-, мета- и пара-ксилолов; д) нафталина.
9. Напишите структурные формулы всех изомерных углеводородов бензольного ряда состава C_8H_{10} . Назовите их.
10. Напишите для бензола реакции (с образованием однозамещенных производных): а) бромирования; б) нитрования; в) сульфирования. Назовите образующиеся соединения.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 9 Спирты и фенолы.

Общие сведения.


Производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены на гидроксигруппу, называют **спиртами**. В зависимости от числа гидроксигрупп спирты делят на:

- а) одноатомные, содержащие одну гидроксигруппу;
- б) многоатомные, содержащие две, три и более гидроксигрупп.


Одноатомные спирты предельного ряда образуют гомологический ряд, в котором все члены ряда отличаются друг от друга на группу CH_2 . Общая формула одноатомных спиртов предельного ряда $C_nH_{2n+1}OH$.

Химические свойства.


1. Спирты легко взаимодействуют с металлическим натрием:



этанол






этанediол-1,2





фенолят натрия


2. Многоатомные спирты и фенол легко взаимодействуют с щелочами:



3. Спирты взаимодействуют с галогеноводородами:



4. При реакции фенолов и их производных разрыв связи ароматический углерод — кислород происходит с большим трудом, тогда как реакция с бромом в водном растворе проходит быстро и приводит к замещению в орто- и параположении относительно гидроксигруппы:




2,4,6-трибромфенол

Эта реакция является качественной на фенол.

5. Спирты и фенолы реагируют с кислотами, образуя сложные эфиры




кислый этилсерный эфир





тринитрат глицерина

При взаимодействии фенола с азотной кислотой образуется тринитрофенол



2,4,6-тринитрофенол


Получение. Общим способом получения спиртов является обработка галогенопроизводных углеводородов водным раствором щелочи:



Кроме того, спирты получают гидратацией непредельных углеводородов или их окислением. Синтетические спирты получают разными способами:



Важным промышленным способом получения фенола является хлорирование бензола с последующим гидролизом хлорбензола концентрированным (40%-м) раствором щелочи:



Применение. Этанол применяют: для получения синтетического каучука, уксусной кислоты, искусственного шелка, пороха, лекарственных соединений, душистых веществ, в качестве растворителя, для изготовления лаков, красок, ликероводочных изделий. Метанол применяют при получении формальдегида, эфиров, для производства синтетических волокон.

Наибольшее количество глицерина идет на приготовление тринитрата глицерина, который в свою очередь широко используют для производства динамита. Раствор 1%-й тринитрата глицерина применяют в качестве сердечного лекарственного средства. Глицерин используют в пищевой промышленности для подслащивания ликеров, вин. Водные растворы глицерина широко применяют в парфюмерии и медицине, в полиграфии для приготовления невысыхающих красок, а также в текстильной и кожевенной промышленности.

Фенол является исходным сырьем для производства лекарственных веществ, гербицидов. Из фенола получают капролактамы — один из важнейших продуктов для производства синтетических волокон.

Цель: изучить химические свойства спиртов и фенолов.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства неорганических веществ лабораторную работу Спирты и фенолы.

Опыт № 1 Взаимодействие спирта с натрием



В пробирку прилейте безводный этиловый спирт. Добавьте маленький кусочек натрия. Пробирку закройте пробкой с маленькой стеклянной трубочкой, конец которой оттянут. Подождите 4-5 секунд, пока будет вытеснен из пробирки воздух, и подожгите выделяющийся газ. Результаты экспериментов оформите

в лабораторном журнале.

Опыт № 2. Окисление спиртов

Внимание! Работу проводить в вытяжном шкафу! В две пробирки налейте хромовую смесь. В первую пробирку при встряхивании прилейте этиловый спирт. Во вторую пробирку при встряхивании прилейте гептанол-1. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале. Примечание. При окислении первичных алканолов хромовой смесью образуются альдегиды или карбоновые кислоты. Образующиеся альдегиды для исключения дальнейшего окисления должны удаляться из реакционной массы отгонкой.



Опыт № 3. Получение сложных эфиров

Внимание! Работу проводить в вытяжном шкафу! Соберите прибор, изображенный на рисунке. В круглодонной колбе смешайте ледяную уксусную кислоту, спирт и концентрированную серную кислоту. Колбу нагрейте до кипения на песчаной бане. Нижний слой жидкости из ловушки периодически сливайте – это вода, верхний слой переливайте в капельную воронку и по каплям возвращайте в реакционную колбу. Охладите реакционную смесь до комнатной температуры и перелейте ее в делительную воронку. Смешайте смесь с водой и отделите верхний слой жидкости. Учтите, что полученный эфир будет содержать примеси кислоты и воды. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.



Опыт № 4. Качественная реакция на глицерин



В пробирку прилейте водный раствор сульфата меди (II) и раствор щелочи. К образовавшемуся осадку прилейте несколько капель многоатомного спирта и смесь перемешайте встряхиванием. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 5. Качественная реакция на фенол



В три пробирки поочередно прилейте растворы фенола, м-крезола и п-крезола. В каждую из них добавьте по несколько капель хлорида железа (III). Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 6. Бромирование фенола



В пробирку прилейте водный раствор фенола. При встряхивании по каплям добавляйте бромную воду. Какой продукт образуется при действии избытка бромной воды на трибромфенол? Составьте уравнение реакции. Результаты эксперимента оформите в лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Какие соединения называют спиртами?
2. Классификация и номенклатура спиртов. Каковы различия между первичными, вторичными и третичными спиртами
3. Физические свойства спиртов.
4. Химические свойства спиртов.
5. Получение спиртов.
6. Применение спиртов.
7. Напишите структурные формулы бутилового спирта и назовите их согласно международной номенклатуре.
8. Напишите структурные формулы следующих одноатомных спиртов:
2-метилпропанол-2
2,3-диметилпентанол-3
2,4,4-триметилпентанол-2
2,3-диметилбутанол-2

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Лабораторные занятия № 10 Альдегиды и кетоны.

Лабораторные занятия № 11 Карбоновые кислоты

Общие сведения.


Карбоновые кислоты — это производные углеводородов, в молекулах которых содержится одна или несколько *карбоксовых* групп COOH. Карбоновые кислоты могут

быть насыщенными (предельными) и ненасыщенными (непредельными), содержащими в молекулах двойные или тройные связи. Число карбоксильных групп в молекуле определяют активность кислоты. Различают одноосновные, двухосновные и многоосновные. Карбоновые кислоты могут включать и другие функциональные группы.


Все карбоновые кислоты подобно неорганическим кислотам обладают кислотными свойствами и при диссоциации образуют ионы водорода.

Химические свойства

1. Карбоновые кислоты реагируют с активными металлами, их оксидами и щелочами:




2. Карбоновые кислоты вступают в реакции замещения гидроксила карбоксильной группы. Замещение гидроксила остатком спирта приводит к образованию сложных эфиров:




Такая реакция называется реакцией этерификации.

При действии на кислоту аммиаком происходит замещение гидроксила карбоксильной группы остатком аммиака — аминогруппой —NH₂:




3. При восстановлении кислот образуются соответствующие альдегиды:



Получение карбоновых кислот.

Первичные спирты окисляются через стадию образования альдегидов:



Цель: изучить химические свойства карбоновых кислот.

Оборудование и материалы: химические стаканы, шпатель, кусочки фарфора, колба-испаритель, водяной холодильник, водяная баня, песчаная баня, весы, делительная воронка, загрязненный раствор медного купороса, загрязненная вода, эмульсия масла, чистый бензин, фарфоровая чашка.

Порядок выполнения работы:

Откройте Виртуальную лабораторию химии. Выберите в меню раздел свойства органических веществ лабораторную работу Карбоновые кислоты и их производные

Опыт №1. Реакция “серебряного зеркала” муравьиной кислоты



В обезжиренную пробирку прилейте раствор нитрата серебра. Осторожно, по каплям при встряхивании прибавляйте раствор аммиака, пока образующийся сначала осадок полностью не растворится. К полученному бесцветному раствору прибавьте несколько капель муравьиной кислоты. Осторожно нагрейте пробирку в пламени горелки. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 2. Реакция этерификации”.

Внимание! Работу проводить в вытяжном шкафу! Соберите прибор, изображенный на рисунке. В круглодонной колбе смешайте ледяную уксусную кислоту, спирт и



концентрированную серную кислоту. Колбу нагрейте до кипения на песчаной бане. Нижний слой жидкости из ловушки периодически сливайте – это вода, верхний слой переливайте в капельную воронку и по каплям возвращайте в реакционную колбу. Охладите реакционную смесь до комнатной температуры и перелейте ее в делительную воронку. Смешайте смесь с водой и отделите верхний слой жидкости. Учтите, что полученный эфир будет содержать примеси кислоты и воды. Результаты экспериментов оформите в лабораторном журнале.

Опыт №3. Выделение высших карбоновых кислот из мыла



В химический стакан поместите мыло и прилейте дистиллированную воду. Смесь нагрейте на водяной бане до полного растворения мыла. Добавьте разбавленную соляную кислоту и продолжайте нагревать смесь до образования двух слоев. Дайте стакану остыть и поставьте его в кристаллизатор с холодной водой. Результаты экспериментов и свои расчеты оформите в лабораторном журнале.

Опыт № 4. Свойства олеиновой кислоты (взаимодействие с Br₂ и KMnO₄)”.



В пробирку прилейте бромную воду и олеиновую кислоту. Смесь энергично взболтайте. В пробирку прилейте раствор перманганата калия и олеиновую кислоту. Смесь энергично перемешайте. Результаты экспериментов и свои расчеты оформите в лабораторном журнале.

Вопросы к итоговому контролю

1. Какие вещества называют карбоновыми кислотами? Какая функциональная группа у карбоновых кислот?
2. Классификация карбоновых кислот.
3. Что определяет активность карбоновой кислоты? Могут ли карбоновые кислоты включать в себя другие функциональные группы?
4. Номенклатура карбоновых кислот. Приведите формулы первых 5 карбоновых кислот.
5. Физические свойства карбоновых кислот.
6. Получение карбоновых кислот.
7. Химические свойства карбоновых кислот.
8. Применение карбоновых кислот.

По окончании работы сформулируйте **Вывод**, основываясь на результатах проделанных опытов. Оформите отчет о проделанной работе.

Список использованных источников

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-09-103623-7
2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс: базовый уровень / О. С Габриелян, И.Г Остроумов., С.А. Сладков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-09-103623-7
3. Еремин В.В. Химия10 класс: базовый уровень / В.В. Еремин и др. Под редакцией Лунина В.В. — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023 – 212 с. – ISBN 978-5-09-110489-9
4. Еремин В.В. Химия11 класс: базовый уровень / В.В. Еремин и др. Под редакцией Лунина В.В. — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023 – 217 с. – ISBN 978-5-09-107469-7
5. Журин А. А. Химия: 10–11-е классы : базовый уровень / А. А. Журин — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 324 с. — ISBN 978-5-09-097512-4
6. Пузаков С. А. Химия: 10-й класс: углублённый уровень / С. А Пузаков., Н. В. Машнина, В. А.Попков — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 241 с. — ISBN 978-5-09-110491-2
7. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия: 11-й класс: базовый уровень: учебное пособие для спо / Г. Е Рудзитис., Ф. Г Фельдман. — Издательство «Просвещение» Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 336 с. — ISBN 978-5-09-108904-2
8. Брещенко, Е. Е. Биохимия: биологически активные вещества. Витамины, ферменты, гормоны : учебное пособие для спо / Е. Е. Брещенко, К. И. Мелконян. 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 136 с. — ISBN 978-5-507-46034-2